

## **Betegtájékoztató HASI / KISMEDENCEI MR VIZSGÁLATHOZ ADOTT BUSCOPAN INJEKCIÓRÓL**

### **Kedves Páciensünk!**

Tisztelettel üdvözlük Önt a CORSO MRI Diagnosztika munkatársai. Kérjük, hogy olvassa el rövid tájékoztatónkat, amiben bemutatjuk Önnek az MRI vizsgálatához adott kiegészítő gyógyszer – BUSCOPAN injekció – lényegét.

### **A KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYSZERADÁS INDOKA ÉS A BEADÁSÁNAK LEHETSÉGES AKADÁLYAI:**

Bizonyos hasi / kismedencei (bél) MR vizsgálatok esetén – az élesebb képi megjelenítés érdekében – bélmozgást csökkentő gyógyszer adására lehet szükség, melyet bőr alá fecskendezünk be kis mennyiségben. A gyógyszer neve: BUSCOPAN 20 mg/ml. Ha Önnek javasolt adni ezt a készítményt, kérjük, olvassa el az erre vonatkozó – alábbi - speciális betegtájékoztatónkat.

A hasi / kismedencei eltérések tisztázását a bélmozgások okozta műtermékek megzavarhatják, a vizsgálat diagnosztikus értékét lerontják. E probléma megoldására világszerte alkalmaznak olyan gyógyszereket, amelyek a zavaró bélmozgások átmeneti felfüggesztésével a vizsgálat lehető legjobb minőségű lebonyolításához segítenek hozzá.

Önnél BUSCOPAN 20 mg-ját tartalmazó vénás injekció beadását tervezzük. Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő betegtájékoztatót, és válaszoljon a fölött kérdésekre.

A gyógyszer az alábbi betegségeknél nem alkalmazható, tehát van-e Önnek:

A hyoscine-N-butylbromide-ra vagy a készítmény bármely összetevőjére  
túlérzékenysége? igen / nem

Kezeletlen zárt csarnokzugú glaucoma (zöldhályog)? igen / nem

Vizelet visszatartást okozó prostata megnagyobbodás? igen / nem

A tápcsatorna szervi eredetű szűkülete? igen / nem

Szopora szívverés? igen / nem

Vastagbél-tágulat? igen / nem

Veleszületett izomgyengeség (myasthenia gravis)? igen / nem

A Buscopan hatására a szem nehezen alkalmazkodhat a közel- és távollátáshoz, ezért a készítmény injekcióban való alkalmazását követően a látás normalizálódásáig nem szabad gépjárművet vezetni vagy gépet üzemeltetni. Kérjük, hogy a vizsgálatra kísérővel érkezzen.

Különleges figyelmeztetések: Nem diagnosztizált és emiatt kezeletlen zárt csarnokzugú glaucomában (zöldhályog) a Buscopan hatására emelkedhet a szem belnyomása. Ennek megfelelően az injekció beadása után jelentkező szemfájdalom és a szem látászavarral járó kivörösödése esetén haladéktalanul szemész szakorvoshoz kell fordulni. Buscopan injekció alkalmazása után szórványosan észleltek anafilaxiás (súlyos allergiás) reakciót, olykor keringési shock kíséretében. Mint minden más, ilyen természetű gyógyszer esetében, a Buscopan injekcióval kezelt betegeket is rövid ideig megfigyelés alatt kell tartanunk.

Alkalmazható-e a BUSCOPAN injekció egyéb gyógyszerekkel egy időben?

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a recept nélkül kapható gyógyszereket is. A Buscopan befolyásolhatja az alábbi gyógyszerek hatását: triciklikus antidepresszánsok (depresszió elleni szerek: imipramine = Melipramine, clomipramine = Anafranil/trimipramine = Sapilent/amytriptyline = Teperin, maprotiline = Ludiomil), antihisztaminok (allergia elleni szerek, pl. Chromosandoz), quinidine és disopyramide (szívritmuszavarban alkalmazott szerek = Chinidin, Palpitin), amantadine (Parkinson-kórban alkalmazott szer = Viregyt, PK-MERZ), dopamine-antagonisták (pl. Metoclopramide = Cerucal – hányinger- és hányáscsökkentő szerek, Dopamin),  $\beta$ -receptor antagonisták (asthma-ellenes szerek, pl. =Fenoterol, Salbutamol, Terbutalin, Salmeterol).

Alkalmazható-e az injekció terhességben vagy szoptatás ideje alatt? A hosszú múltra visszatekintő klinikai alkalmazás során nem észleltek kedvezőtlen hatásokat a terhesség időszakában. Mindazonáltal a terhesség (különösen annak első trimesztere) alatt végzett gyógyszeres kezelésre vonatkozó általános biztonsági előírásokat kell szem előtt tartani.

Nem bizonyított, hogy a Buscopan biztonságosan adható-e a szoptatás ideje alatt. Alkalmazása során nem észlelték a szoptatott újszülöttek károsodását.

Milyen nemkívánatos hatásai lehetnek a BUSCOPAN injekciónak? Mellékhatásként szájszárazságot, a verejtékmirigyek működési zavarát, szopora szívverést, és olykor vizelet visszatartást okozhat. Ezek a mellékhatások azonban rendszerint enyhék, és spontán megszűnnek. Szórványosan túlérzékenységi reakciókat (elsősorban bőrreakciókat) észleltek. Rendkívül ritkán beszámoltak nehézlégzéssel és keringési sokkal járó anafilaxiás reakcióról.

Kedves Páciensünk! A vizsgálat elvégzésébe, vénás kontrasztanyag illetve szükség esetén Buscopan injekció adásába minden esetben írásos beleegyezését kell adnia, beleegyezésének hiányában az MRI vizsgálatot nem végezzük el. A CORSO MRI Diagnosztika Egészségügyi Szolgáltató Kft. valamennyi orvosa, asszisztense készséggel áll rendelkezésére, bármely kérdés megválaszolására, mely a vizsgálattal kapcsolatban felmerül Önben.

Köszönjük együttműködését!

CORSO MRI Diagnosztika Kft. munkatársai